


ZEIGE DIE EINBUSSEN UND RISIKEN DEINEM KUNDEN AUF

INSEKTEN SIND MEHR ALS NUR LÄSTIG...

EINBUSSEN IN DER LEISTUNG

Eine hohe Insektenbelästigung kann die Leistung bis 25 % reduzieren¹




WICHTIGE ROLLE WEIDEKERATITIS

Begünstigen eine Infektion
Überträger des Erregers



ÜBERTRÄGER VON MASTITIS

Deltamethrin reduziert Fliegenhäufigkeit und damit Übertragung pathogener Bakterien²



UND ER KOMMT ZU DEN ERKENNTNISSEN

Ja, das bin ich meinen Tieren schuldig und es lohnt sich auch für mich!



...ABER NICHT NÖTIG
SCHÜTZE DEINE TIERE JETZT
MIT BUTOX[®] PROTECT



REFERENZEN

- 1 Romel M. et al, Veterinärmedizinische Parasitologie, 5., vollst. Neubearb. Aufl. – Berlin: Parey, 2000, Seite 326
- 2 Arsenopoulos K. et al, 2018; Fly repellency using deltamethrin may reduce intramammary infections of dairy cows under intensive management, Comparative Immunology, Microbiology and Infectious Diseases 61 (2018) 16-23

Butox® Protect 7.5 pour-on ad us. vet., Suspension zum Aufgiessen. Insektizid für Rinder und Schafe. **Wirkstoff:** Deltamethrin. **Indikationen:** Insektizid für Rinder und Schafe. Zur Behandlung und Prophylaxe des Befalls mit folgenden Insekten: *Rinder:* - Läuse (*Linognathus vituli*, *Haematopinus eurysternus*), Haarlinge (*Bovicola bovis*), stechende (*Stomoxys calcitrans*, *Haematobia* spp.) sowie nicht-stechende Weidefliegen (*Musca* spp., *Hippobosca* spp.). *Schafe:* - Läuse (*Linognathus ovis*), Haarlinge (*Bovicola ovis*), Schaflausfliege (*Melophagus ovinus*). **Dosierung / Anwendung:** Zum Aufgiessen (Pour-on-Verfahren). Vor Gebrauch gut schütteln. Die Suspension gleichmässig entlang der Rückenlinie vom Hals bis zur Schwanzwurzel aufbringen. Bei Befall mit *Weidefliegen:* *Rinder:* Bis 100 kg: 10 ml Butox Protect 7.5 pour-on; von 100-300 kg: 20 ml Butox Protect 7.5 pour-on; über 300 kg: 30 ml Butox Protect 7.5 pour-on. Bei Befall mit *Läuse, Haarlinge* und *Schaflausfliegen:* *Rinder/Schafe:* 10 ml Butox® Protect 7.5 pour-on pro Tier. **Kontraindikationen:** Resistenz gegen Pyrethroide. **Vorsichtsmassnahmen für die Anwendung bei Tieren:** Nicht auf Augen und Schleimhäute der Tiere oder in deren Nähe verabreichen. Die Behandlung sollte nicht während starker Hitzeperioden durchgeführt werden (Ableckungsgefahr). Um die Resistenzentwicklung und letztendlich die Unwirksamkeit der Behandlung zu vermeiden, soll die zu häufige und wiederholte Anwendung von Insektiziden einer Substanzklasse über einen längeren Zeitraum vermieden werden. Butox® Protect 7.5 pour-on sollte nur auf gesunde Hautpartien aufgetragen werden, da es beim Vorliegen grösserer Hautläsionen zu resorptiven Vergiftungen kommen kann. Deltamethrin ist toxisch für Bienen und darf nicht in Gewässer gelangen, da es toxisch für Fische und andere aquatische Organismen ist. **Vorsichtsmassnahmen für die Anwender:** Es können Reizungen, Sensibilisierungen und Beeinträchtigung des Nervensystems auftreten. Kontakt mit Haut, Schleimhäuten und Augen sowie eine orale Aufnahme vermeiden. Bei der Anwendung Schutzhandschuhe tragen. Stark kontaminierte Kleidung ist unmittelbar zu wechseln und vor erneutem Gebrauch zu waschen. Während des Umgangs mit Butox® Protect 7.5 pour-on nicht essen, trinken und rauchen. Bei Hautkontakt sind betroffene Stellen intensiv mit Wasser und Seife zu reinigen. Bei Kontakt mit den Augen sofort mit reichlich Wasser spülen. Bei Auftreten von Beschwerden nach Anwendung von Butox® Protect 7.5 pour-on unverzüglich einen Arzt zu Rate ziehen und die Packungsbeilage oder das Etikett vorzeigen. Personen mit bekannter Überempfindlichkeit gegen das Tierarzneimittel oder einen seiner Bestandteile sollten den Umgang mit diesem Produkt vermeiden. Deltamethrin ist hochtoxisch für Dunginsekten. Durch wiederholte Behandlungen kann es zu Langzeiteffekten kommen. Dies sollte berücksichtigt werden, z.B. indem Weidetiere auf der gleichen Fläche pro Weidesaison nur einmal behandelt werden. **Unerwünschte Wirkungen:** Deltamethrin wirkt lokal reizend auf Auge und Schleimhäute. Nach Behandlung wurden in sehr seltenen Fällen Hautirritationen verbunden mit Unruhe und heftigen Kopf- und Schwanzbewegungen beobachtet. **Wechselwirkungen:** In Verbindung mit organischen Phosphorverbindungen potenziert sich die Toxizität von Deltamethrin. Von einem kombinierten Einsatz solcher Tierarzneimittel mit Butox® Protect 7.5 pour-on ist daher abzusehen. **Inkompatibilitäten:** Da keine Kompatibilitätsstudien durchgeführt wurden, darf dieses Tierarzneimittel nicht mit anderen Tierarzneimitteln gemischt werden. **Absetzfristen:** *Rind:* Essbare Gewebe: 18 Tage, Milch: 0 Tage; *Schaf:* Essbare Gewebe: 1 Tag, Milch: 12 Stunden. **Abgabekategorie:** B. **Zulassungsinhaber:** MSD Animal Health GmbH, Luzern. **Zusätzliche Informationen:** Siehe Packungsbeilage oder www.tierarzneimittel.ch